

キバナノアマナ

Gagea lutea (L.) Ker Gawl.
ユリ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は 10 地点以下である。

分 布

北海道～九州に分布するが西日本では稀。県内では嶺北の一部で見られる。

種の特徴

山野の明るい草地に生える多年草。葉は線形で根生し、長さ 15～30 cm、やや厚い。花期は 4～5 月。高さ 15～25 cm の花茎の先に 4～10 個の黄色い花を付ける。

生育を脅かす要因

草地の開発、遷移の進行

参考文献 福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
							○	○	○	○						○	○

チシマアマナ

Lloydia serotina (L.) Rehb.
ユリ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

大野市の亜高山帯でのみ生育が確認されており、個体数も少ない。

分 布

北海道～本州（中部以北）に分布。県内では奥越の亜高山の 1 地点にのみ分布。

種の特徴

高山の岩場に生える多年草。葉は長さ 7～20 cm、通常 2 個で根生する。花は 6～8 月。高さ 7～15 cm の花茎に白色の花を 1 個付ける。

生育を脅かす要因

産地局限

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

ムギラン

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.
ラン科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

県内での生育地、生育数ともに少ない。

分 布

国内分布は、本州の関東以西～九州。県内分布は、若狭町、おおい町。

種の特徴

常緑広葉樹林内の樹木や岩上に着生。葉は小さく卵円形、長さ 1～3 cm、幅 6～8 mm、先は円形。花は黄白色で茎の基部に付き、長さ 3～3.5 mm。

生育を脅かす要因

自然度の高い常緑広葉樹林の減少。

参考文献 大橋広好ほか（2015）、前川文夫（1971）、遊川知久ほか（2015）
福井県植物研究会（2001）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○	○															