

# オオタマツリスゲ

*Carex filipes* Franch. et Sav. var. *rouyana* (Franch.) Kük.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地点は2箇所であり、いずれの生育地でも個体数が少ないので、県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

## 分 布

本州（東北地方南部～近畿地方）に分布。県内では嶺北地方で確認されている。

## 種の特徴

暖温帯に生育。葉は粉緑色で前年の葉は枯れて残らない。基部の鞘は淡褐色。

## 生育を脅かす要因

林道拡幅等の環境改変。森林伐採。

## 参考文献

| 市 町 別<br>生育情報 | 若狭町 | おおい町 | 高浜町 | 美浜町 | 小浜市 | 敦賀市 | 越前町 | 南越前町 | 池田町 | 永平寺町 | 坂井市 | 越前市 | あわら市 | 鯖江市 | 勝山市 | 大野市 | 福井市 |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|               |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |     | ○   | ○    |     |     |     |     |

# ウマスゲ

*Carex idzuroei* Franch. et Sav.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地点は1箇所、個体数も減少傾向であるため県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

## 分 布

本州（関東地方以西）～九州に分布。県内では嶺北地方で確認されている。

## 種の特徴

湿地に生える多年草。有花茎は高さ40～60cm。葉幅は4～8mm、小穂は離れてつき、苞の葉身は小穂よりも長い。

## 生育を脅かす要因

生育地の乾燥化

## 参考文献

| 市 町 別<br>生育情報 | 若狭町 | おおい町 | 高浜町 | 美浜町 | 小浜市 | 敦賀市 | 越前町 | 南越前町 | 池田町 | 永平寺町 | 坂井市 | 越前市 | あわら市 | 鯖江市 | 勝山市 | 大野市 | 福井市 |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|               | ○   |      |     |     |     |     |     |      |     |      | ○   |     |      |     |     |     |     |

# キンチャクスゲ

*Carex mertensii* Presc. var. *urostachys* (Franch.) Kük.  
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅰ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

既知の生育地点は1箇所、個体数も少ないので県域絶滅危惧Ⅰ類とした。

## 分 布

北海道、本州（東北地方、中部地方）に分布。県内では大野市で確認されている。

## 種の特徴

高山の草地に生える多年草。有花茎は高さ30～50cm。側小穂は雌雄性であり、基部の鞘の色は淡褐色である。

## 生育を脅かす要因

気候変動に伴う生育環境の変化。

## 参考文献

| 市 町 別<br>生育情報 | 若狭町 | おおい町 | 高浜町 | 美浜町 | 小浜市 | 敦賀市 | 越前町 | 南越前町 | 池田町 | 永平寺町 | 坂井市 | 越前市 | あわら市 | 鯖江市 | 勝山市 | 大野市 | 福井市 |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|               |     |      |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |      |     |     | ○   |     |