

# ミヤマクロユリ

*Fritillaria camschatcensis* (L.) Ker Gawl. var. *keisukei* Makino

ユリ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

大野市の亜高山帯でのみ生育が確認されており、個体数も少ない。

## 分 布

北海道～本州の高山に分布する。県内では奥越の亜高山の1地点にのみ分布。

## 種の特徴

高山の草原に生える多年草。茎は高さ10～20cm、3～5輪生の葉を数段つける。花被片が黒紫褐色～黒紫色の花を茎頂に斜め下向きに1～数個つける。

## 生育を脅かす要因

産地局限、登山者による踏みつけ。

## 参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	

# コバイモ

*Fritillaria japonica* Miq.

ユリ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域絶滅危惧Ⅰ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類

## 選定理由

全国的な希少種で、県内でも生育地は限定されている。

## 分 布

本州（東海地方西部、北陸地方西部～中国地方東部）に分布する。県内では嶺北の一部に分布する。

## 種の特徴

落葉広葉樹林の林床や林縁に生える多年草。茎は高さ10～25cm。葉は下方で対生、上方では輪生する。花期は3～4月。釣鐘状で花被に紫褐色の斑紋がある花を斜め下向きにつける。ミノコバイモともいう。

## 生育を脅かす要因

林床の藪化、園芸採取。

## 参考文献

福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
								○				○			○	○	

# クルマユリ

*Lilium medeoloides* A.Gray

ユリ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

## 選定理由

大野市の亜高山帯でのみ生育が確認されており、個体数も少ない。

## 分 布

北海道、本州（近畿以北）、四国に分布。県内では奥越の亜高山の1地点にのみ分布。

## 種の特徴

亜高山の草原に生える多年草。茎は高さ30～100cm、輪生する葉が中央付近に1～3段つく。花期は7～8月。赤橙色の花が横向き～斜め下向きに咲く。

## 生育を脅かす要因

産地局限。

## 参考文献

福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
																○	