

ハガクレスゲ

Carex jacens C.B.Clarke
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は2箇所である。全生育地で生育個体数が限られているので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

本州（白山山系以北の日本海側）に分布。県内では県境山地で確認されている。

種の特徴

亜高山帯の常緑針葉樹林に生える多年草。雌小穂は1～6個で、上部のものから下方のものになるにつれて次第に離れて着き、最下のは根際につく。

生育を脅かす要因

温暖化による生育環境の変化。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
															○	○	

ヤガミスゲ

Carex maackii Maxim.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は5箇所、いずれも河川敷である。生育地での生育個体数が限られているので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

北海道、本州、九州に分布。県内では福井平野の河川敷で確認されている。

種の特徴

河川敷の砂地に生える多年草。有花茎は高さ40～70cm、鋭稜があって著しくざらつく。小穂は上方に雌花、下方に雄花がある。

生育を脅かす要因

河川改修による生育地の破壊。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
											○						○

キノクニスゲ

Carex matsumurae Franch.
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：県域絶滅危惧Ⅱ類 旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

既知の生育地は3箇所であるが、個体数が多いのは1箇所であるので、県域絶滅危惧Ⅱ類とした。

分 布

本州（富山県、愛知県以西）から九州、伊豆諸島等に分布。県内では嶺北の沿岸部で確認されている。

種の特徴

海岸近くの森林の林床や林縁に生える多年草。密に叢生して大株になる。葉は有花茎より長く、果胞は密につき下半部は緑白色が目立つ。

生育を脅かす要因

森林伐採。道路工事。

参考文献

福井県植物研究会（1997）

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
											○						○