

センダイスゲ

Carex lenta D.Don var. *sendaica* (Franch.) T.Koyama
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は8箇所だが、各生育地の個体数は減少しているため、要注目とした。

分 布

本州（岩手県以南）から九州に分布。県内では嶺北、嶺南の沿岸部で確認されている。

種の特徴

海岸に近い平地から低山地の疎林内に生える多年草。ナキリスゲに似るが、小型で、ゆるく叢生し、長い匍匐根茎がある。

生育を脅かす要因

土地造成、森林伐採。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
		○		○	○	○	○				○		○				○

タチスゲ

Carex maculata Boott
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：要注目

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は14箇所だが、生育地の個体数は少なく、開発や環境変化等により容易に減少する恐れがあるので、要注目とした。

分 布

本州（宮城県以南）から九州に分布。県内では嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

湿った草地に生える多年草。葉の下面は乳頭状突起を密布し粉緑色。果胞は全面に乳頭状突起を密布する。柱頭は3岐する。

生育を脅かす要因

土地造成、湿地開発。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○			○		○	○					○	○		○		○

ノゲヌカスゲ

Carex mitrata Franch. var. *aristata* Ohwi
カヤツリグサ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

既知の生育地は8箇所であるが、情報不足の面もあるので、要注目とした。

分 布

本州（福島県以南）から九州に分布。県内では嶺北、嶺南で確認されている。

種の特徴

森林の林縁や路傍に生える多年草。アオスゲ類と間違われることが多いが、基部の鞘が褐色であること、雄小穂が細く糸状であることで区別される。

生育を脅かす要因

林道拡幅、土地造成。

参考文献

市 町 別 生育情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○		○	○	○					○							○